

50 解. 2つの解を $\alpha, 3\alpha$ とすると, 解と係数の関係より,

$$\begin{cases} \alpha + 3\alpha = 4\alpha = 4(m-1) \\ 3\alpha \cdot \alpha = 6m+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = m-1 \quad \dots \textcircled{1} \\ \alpha^2 = 2m+1 \quad \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①を②に代入すると $(m-1)^2 = 2m+1 \Leftrightarrow m(m-4) = 0 \quad \therefore m = 0, 4$

(i) $m = 0$ のとき ①より $\alpha = -1$

(ii) $m = 4$ のとき ①より $\alpha = 3$

$$\text{以上より} \quad \begin{cases} m=0 \text{ のとき } x = -1, -3 \\ m=4 \text{ のとき } x = 3, 9 \end{cases} \quad (\text{答})$$

51 解. $\begin{cases} x+y=p \quad \dots \textcircled{1} \\ x^2+y^2=4 \quad \dots \textcircled{2} \end{cases}$ ①より $y = p-x$ だから, ②に代入して

$$x^2 + (p-x)^2 = 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 2px + p^2 - 4 = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

条件より, ③の判別式 $\frac{D}{4} = p^2 - 2(p^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow p^2 = 8$

$p > 0$ より, $p = 2\sqrt{2}$. これを③に代入

$$2x^2 - 4\sqrt{2}x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - \sqrt{2})^2 = 0 \quad \therefore x = \sqrt{2}, y = \sqrt{2}$$

以上より $p = 2\sqrt{2}, (x, y) = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$ (答)

52 解. (1) 両辺に $x^3 + 1$ をかけて $1 = A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1)$

$$\therefore 1 = (A+B)x^2 + (-A+B+C)x + A+C$$

$$\text{係数を比較すると} \quad \begin{cases} A+B=0 \quad \dots \textcircled{1} \\ -A+B+C=0 \quad \dots \textcircled{2} \\ A+C=1 \quad \dots \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \text{ より } 2A + B + C = 1 \quad \dots \textcircled{4} \quad \textcircled{4} - \textcircled{2} \text{ より } 3A = 1 \quad \therefore A = \frac{1}{3}$$

$$\text{よって } \textcircled{1}, \textcircled{3} \text{ より } B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3} \quad \therefore A = \frac{1}{3}, B = -\frac{1}{3}, C = \frac{2}{3} \quad (\text{答})$$

(2) 両辺に $(x-1)^2(x+2)$ をかけると

$$4x^2 - 3x + 3 = A(x+2) + B(x-1)(x+2) + C(x-1)^2$$

$$\therefore 4x^2 - 3x + 3 = (B+C)x^2 + (A+B-2C)x + 2A-2B+C$$

$$(1) \text{ と同様にして, 係数を比較して解くと } A = \frac{4}{3}, B = \frac{11}{9}, C = \frac{25}{9} \quad (\text{答})$$

53 解. (1) (i) $x-2 \geq 0$ のとき, つまり $x \geq 2$ のとき

$$x^2 + x - 2 = 4 \Leftrightarrow (x+3)(x-2) = 0$$

$$x \geq 2 \text{ より } x = 2$$

(ii) $x-2 < 0$ のとき, つまり $x < 2$ のとき

$$x^2 - x + 2 = 4 \Leftrightarrow (x+1)(x-2) = 0 \quad x < 2 \text{ より } x = -1$$

$$(i), (ii) \text{ より } x = 2, -1 \quad (\text{答})$$

(2) (i) $x^2 + x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow (x+3)(x-2) \geq 0$ のとき, つまり $x \leq -3, x \geq 2 \cdots \textcircled{1}$ のとき

$$x^2 + x - 6 \leq x+1 \Leftrightarrow x^2 - 7 \leq 0 \quad \therefore -\sqrt{7} \leq x \leq \sqrt{7} \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ より } 2 \leq x \leq \sqrt{7}$$

(ii) $x^2 + x - 6 < 0 \Leftrightarrow (x+3)(x-2) < 0$ のとき, つまり $-3 < x < 2 \cdots \textcircled{3}$ のとき

$$-x^2 - x + 6 \leq x+1 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 5 \geq 0 \quad \therefore x \leq -1 - \sqrt{6}, x \geq -1 + \sqrt{6} \cdots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{ より } -1 + \sqrt{6} \leq x < 2$$

$$(i), (ii) \text{ より } -1 + \sqrt{6} \leq x \leq \sqrt{7} \quad (\text{答})$$

54 解. $z-2 = \sqrt{3}i \Rightarrow (z-2)^2 = -3 \Rightarrow z^2 - 4z + 7 = 0$

$$z^4 - 4z^3 + 7z^2 = z^2(z^2 - 4z + 7) = 0 \quad \therefore 0 \quad (\text{答})$$

55 解. $z = a + bi$ (a, b は実数) とおくと

$$z^3 = (a+bi)^3 = a^3 + 3a^2bi - 3ab^2 - b^3i = (a^3 - 3ab^2) + (3a^2b - b^3)i = i$$

$$\text{複素数の相等より} \begin{cases} a^3 - 3ab^2 = a(a^2 - 3b^2) = 0 \cdots \textcircled{1} \\ 3a^2b - b^3 = 1 \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①より $a = 0$ または $a^2 = 3b^2$ であるから

(i) $a = 0$ のとき ②より $b^3 = -1$. b は実数だから $b = -1$.

(ii) $a^2 = 3b^2$ のとき ②より $b^3 = \frac{1}{8}$. b は実数だから $b = \frac{1}{2}$.

$$\text{よって } a^2 = \frac{3}{4} \quad \therefore a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{以上より, } z = -i, \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \quad (\text{答})$$